

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ СИНТОМИЦИН

Торговое название препарата: Синтомицин
Действующее вещество (МНН): хлорамфеникол
Лекарственная форма: линимент
Состав:

активное вещество: синтомицин – 5 г или 10 г.

вспомогательные вещества: масла касторового, эмульгатор №1, кислота сорбиновой, натрия карбоксиметилцеллюлоза, вода очищенная.

Описание: линимент белого или белого с желтоватым оттенком цвета, со слабым своеобразным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальное средство.

Код АТХ: D06AX02

Фармакологические свойства

Антибиотик широкого спектра действия. Механизм действия связан с нарушением синтеза белков микроорганизмов. Оказывает бактериостатическое действие. Активен в отношении ко многим грамположительным и грамотрицательным бактериям, в том числе к кишечной палочке, палочке инфлюэнцы, риккетсиям, спирохетам и некоторым крупным вирусам (вирусы трахомы, пситтакоза), возбудителям раневых инфекций и различных форм гнойно-воспалительных процессов, угнетает жизнедеятельность бактерий, устойчивых к пенициллину, стрептомицину, сульфаниламидам.

Показания к применению

Гнойные раны, гнойно-воспалительные заболевания кожи и слизистых оболочек, трахома, сикоз, фурункулёз, карбункулы, длительно незаживающие трофические язвы, инфицированные ожоги II и III степени, пролежни, трещины сосков у кормящих женщин, пиодермия, кератиты, блефариты.

Способ применения и дозы

Наружно. Перед применением линимент перемешивают. Наносят на область поражения непосредственно или в виде пропитанных линиментом марлевых тампонов. Сверху накладывают обычную повязку, можно с пергаментной или компрессной бумагой. перевязки производят в зависимости от показаний через каждые 1-3 дня, иногда через 4-5 дней. Для лечения тяжелых инфицированных ран, ожогов и длительно незаживающих ран и язв рекомендуется применять 5% или 10% линимент.

При трещинах сосков в течение 2-5 дней после каждого кормления ребенка соски грудных желез обмывают 0,25% раствором нашатырного спирта, на трещину накладывают густой слой линимента на стерильной салфетке.

Для лечения трахомы применяют 5% линимент, который закладывают за веко 2-3 раза в сутки. Курс лечения – 1-3 месяца.

Побочные действия

Местные аллергические реакции (зуд, покраснение или сухость обрабатываемого участка кожи, кожно-аллергические реакции).

Противопоказания

Псориаз, экзема, грибковые заболевания, беременность, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату.

Особые указания

С осторожностью следует назначать больным с поражениями почек, новорожденным.

Форма выпуска

5% или 10% линимент. По 20 г, 25 г или 30 г в тубах. Каждую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек


Без рецепта.

Производитель:

ООО «Dentafill Plus»

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

ООО «Dentafill Plus» 100102, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Сергелийский район, улица Маргиб, дом 1. Тел./Факс: (+998 71) 231-78-00 www.dentafill.uz



ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА СИНТОМИЦИН

Препаратнинг савдо номи: Синтомицин

Таъсир этувчи модда (ХПН): хлорамфеникол

Дори шакли: линимент

Таркиби:

фаол модда: синтомицин – 5 г ёки 10 г.

ёрдамчи моддалар: канакунжут мойи, №1 эмульгатор, сорбин кислотаси, натрий карбоксиметилцеллюлоза, тозаланган сув.

Таърифи: оқ сарғиш тусли ёки оқ рангли, кучсиз ўзига хос ҳидли линимент.

Фармакотерапевтик гуруҳи: бактерияларга қарши восита.

АТХ коди: D06AX02

Фармакологик хусусиятлари

Кенг таъсир доирасига эга антибиотик. Таъсир механизми микроорганизмларнинг оксиллари синтезини бузилиши билан боғлиқ. Бактериостатик таъсир кўрсатади. Кўпчилик грамманфий ва грамусбат бактерияларга, шу жумладан ичак таёқчаси, инфлюэнц таёқчаси, риккетсиялар, спирохеталар ва айрим йирик вирусларга (трахома, пситтакоз вируслари), жарохат инфекцияларининг кўзгатувчиларига ва йирингли-яллиғланиш жараёнларнинг турли шакллариغا нисбатан юқори антибактериал фаолликка эга; пенициллин, стрептомицин, сульфаниламидларга чидамли бактерияларнинг ҳаёт фаолиятини сусайтиради.

Қўлланилиши

Йирингли жарохат, тери ва шиллиқ қаватларининг йирингли-яллиғланиш касалликлари, трахома, сикоз, фурункулёз, карбонкуллар, узоқ вақт битмайдиган трофик яралар, II ва III даражали инфекцияланган куйишлар, ётоқ яралар, эмизикли аёлларнинг кўкрак сўрғичларини ёриклари, пиодермия, кератит, блефаритларда қўлланади.

Қўллаш усули ва дозалари

Сиртга қўлланилади. Қўллаш олдидан линимент аралаштирилади. Шикастланган жойга бевосита суртилади ёки линимент шимдирилган дока тампонлар кўринишида қўйилади. Устидан оддий боғлов қўйилади, компресс ёки пергамент қоғоз билан қўйиш мумкин. Кўрсатмага қараб 1-3 ёки айрим ҳолларда 4-5 кундан сўнг боғлов алмаштирилади. Оғир инфекцияланган яраларни, куйишларни ва узоқ вақт битмайдиган жарохатлар ва яраларни даволаш учун 5% ёки 10% линимент ишлатиш тавсия этилади.

Кўкрак сўрғичларининг ёрикларида 2-5 кун давомида ҳар сафар бола эмизилганидан сўнг, кўкрак безларининг сўрғичлари 0,25% ли нашатир спирти билан ювилади, ёрикқа стерил салфеткада линимент қўйилади.

Трахомани даволашда 5% линимент ишлатилади, у кунига 2-3 марта қовоқ орқасига қўйилади. Даволаш курси 1-3 ой.

Ножўя таъсирлари

Маҳаллий аллергик реакциялар (терининг ишлов берилётган соҳаларини қичишиши, қизариши ёки қуриши тери - аллергик реакциялари) кузатилиши мумкин.

Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар

Псориаз, экзема, замбуруғли касалликлар, ҳомиладорлик, препаратга юқори шахсий сезувчанликда қўллаш мумкин эмас.

Махсус кўрсатмалар

Буйракларнинг шикастланишлари бўлган беморларда ва янги туғилган чақалоқларда эҳтиёткорлик билан қўллаш лозим.

Чиқарилиш шакли

5% ёки 10% ли линимент, 20 г, 25 г ёки 30 г дан тубаларда. Ҳар бир туба тиббиётда қўлланилишига доир йўриқнома билан бирга картон қутига жойланган.

Сақлаш шароити

Ёруғликдан ҳимояланган жойда, 25⁰С юқори бўлмаган ҳароратда сақлансин. Болалар ололмайдиган жойда сақлансин.

Яроқлилик муддати

2 йил.

Яроқлилик муддати ўтгач қўлланилмасин.

Дорихоналардан бериш тартиби

Рецептсиз.

Ишлаб чиқарувчи:

“Dentafill Plyus” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситаларининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили
“Dentafill Plyus” МЧЖ 100102, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Сирғали тумани,
Марғиб кўчаси, 1-уй. Тел./Факс: (+998 71) 231-78-00 www.dentafill.uz